



CONSEJO  
DE  
SALUBRIDAD GENERAL

## COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTROFICOS

### GRUPO TÉCNICO MALFORMACIONES VÍAS URINARIAS

**Categoría: Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos**

**Subgrupo :Uretra y pene**

**Enfermedad: Estenosis de meato uretral (Clasificación Internacional de Enfermedades: Q64 Otras malformaciones congénitas del sistema urinario Q643 Otras atresias y estenosis de la uretra y del cuello de la vejiga Q647 Otras malformaciones congénitas de la vejiga y de la uretra Q648 Otras malformaciones congénitas del aparato urinario, especificadas Q649 Malformación congénita del aparato urinario, no especificada)**

| <b>Etapas de intervención</b>   | <b>Tratamientos / intervenciones</b>  | <b>Medicamentos</b>   | <b>Otros insumos</b>   |
|---|---|---|--|
| IDENTIFICACIÓN INICIAL<br>VALORACIÓN MÉDICA Y CLASIFICACIÓN<br>PEDIATRÍA Y/O CIRUJANO PEDIATRA                | Exploración clínica<br>Exámenes iniciales:<br>EGO, urocultivo<br>Cisto-uretrografía miccional   |   | Laboratorio clínico<br>Medio de contraste hidrosoluble<br>Equipo de fluoroscopia   |
| TRASLADO A UNIDAD DE SEGUNDO NIVEL<br>QUE CUENTEN CON CIRUJANO PEDIATRA<br>(EN EL CASO DE ESTENOSIS DE MEATO) | Exámenes de laboratorio<br>complementarios: <ul style="list-style-type: none"><li>• Biometría hemática completa</li><li>• Tiempos de coagulación</li><li>• Meatotomía</li></ul> | <b>Preoperatorio:</b><br><br>Antibióticos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Primera elección: Amoxicilina<br/>30 – 50 mgs/kg/día, o<br/>trimetropin-sulfametoxazol 10<br/>mg/kg/día dependiendo de la<br/>edad, por 10 días</li><li>• Segunda: elección:<br/>Amoxicilina + ácido clavulánico<br/>30 – 40 mg/kg/día por 10 días</li></ul> | De acuerdo con cada laboratorio de análisis<br>clínicos de la unidad tratante.<br><br>Sala de quirófanos equipo de anestesia<br>adecuado |



CONSEJO  
DE  
SALUBRIDAD GENERAL

## COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTROFICOS

### GRUPO TÉCNICO MALFORMACIONES VÍAS URINARIAS

**Categoría: Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos**

**Subgrupo :Uretra y pene**

**Enfermedad: Estenosis de meato uretral (Clasificación Internacional de Enfermedades: Q64 Otras malformaciones congénitas del sistema urinario Q643 Otras atresias y estenosis de la uretra y del cuello de la vejiga Q647 Otras malformaciones congénitas de la vejiga y de la uretra Q648 Otras malformaciones congénitas del aparato urinario, especificadas Q649 Malformación congénita del aparato urinario, no especificada)**

VALORACIÓN Y MANEJO POR URÓLOGO  
PEDIATRA (EN EL CASO DE ESTENOSIS  
SUBMEATAL)

- Meatotomía
- Flujometría (en los casos con persistencia de sintomatología o infecciones urinarias recurrentes)

**Transoperatorio:**

Anestesia general o bloqueo regional.

Postoperatorio:

Antibióticos:

Primera elección:

- Amoxicilina 30 – 50 mgs/kg/día, o
- Trimetropin-sulfametoxazol 10 mg/kg/día dependiendo de la edad, por 10 días

Segunda elección:

- Amoxicilina + ácido clavulánico 30 – 40 mg/kg/día por 10 días

Tercera elección:

- Cefixime 8 – 10 mg/kg/día, por 7 a 10 días