



CONSEJO
DE
SALUBRIDAD GENERAL

COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A
ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTROFICOS

GRUPO TÉCNICO MALFORMACIONES VÍAS URINARIAS

| Categoría: Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos Subgrupo :Uretra y pene Enfermedad: Hipospadias [proximal-10%- y distal -90%] (Clasificación Internacional de Enfermedades: Q54 Hipospadias Q540 Hipospadias del glande Q541 Hipospadias peneana Q542 Hipospadias penoscrotal Q543 Hipospadias perineal Q544 Encordamiento congénito del pene Q548 Otras hipospadias Q549 Hipospadias, no especificada Q640 Epispadias) | | | |
|---|--|--------------|---|
| Etapas de intervención | Tratamientos / intervenciones | Medicamentos | Otros insumos |
| IDENTIFICACIÓN INICIAL VALORACIÓN MÉDICA Y CLASIFICACIÓN PEDIATRÍA Y/O CIRUJANO PEDIATRA TRASLADO A UNIDAD DE TERCER NIVEL QUE CUENTEN CON URÓLOGO PEDIATRA | Exploración clínica Exámenes iniciales: <ul style="list-style-type: none"> • BH, Química Sanguínea • EGO, urocultivo • Ultrasonido de vías urinarias (hipospadias proximal) • Cistouretrografía miccional (hipospadias proximal) | | Equipo de ultrasonido Laboratorio de análisis clínicos |
| VALORACIÓN POR UROLOGÍA PEDIÁTRICA | Exámenes de laboratorio complementarios: <ul style="list-style-type: none"> • Biometría hemática completa • Química sanguínea • Tiempos de coagulación y • Grupo sanguíneo <p>Corrección de hipospadias: Primer tiempo: A partir de los 6 meses de edad. Segundo tiempo de hipospadias: a partir de los seis meses posterior al primer tiempo quirúrgico.</p> | | |



CONSEJO
DE
SALUBRIDAD GENERAL

COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A
ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTROFICOS

GRUPO TÉCNICO MALFORMACIONES VÍAS URINARIAS

Categoría: Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos

Subgrupo :Uretra y pene

Enfermedad: Hipospadias [proximal-10%- y distal -90%] (Clasificación Internacional de Enfermedades: Q54 Hipospadias Q540 Hipospadias del glande Q541 Hipospadias peneana Q542 Hipospadias penoscrotal Q543 Hipospadias perineal Q544 Encordamiento congénito del pene Q548 Otras hipospadias Q549 Hipospadias, no especificada Q640 Epispadias)

| Etapas de intervención | Tratamientos / intervenciones | Medicamentos | Otros insumos |
|--|---|--|--|
| <p>VALORACIÓN POR UROLOGÍA PEDIÁTRICA</p> <p>Valoración Genética y Endocrína</p> | <p>Corrección de las complicaciones (incluidas fistulas, estenosis y diverticulos) 4-6 meses después de la última cirugía (puede requerir 2-3 reintervenciones o más)</p> <p>Para los casos de hipospadias proximal: Cariotipo, cromatina sexual, niveles de hormonas esteroideas, electrolitos séricos, pruebas de reserva testicular Ultrasonido pelvico, genitograma y Cistografía</p> | <p>Preoperatorio:</p> <p>Antibióticos:</p> <p>Primera elección:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amoxicilina 30 – 40 mgs/kg/día, o • Trimetropin-sulfametoxazol 10 mg/kg/día dependiendo de la edad, por 10 días <p>Segunda: elección:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amoxicilina + acido clavulanico 30 – 40 mg/kg/día por 10 días <p>Tercera elección:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cefixime 8 – 10 mg/kg/día, por 7 a 10 días <p>Transoperatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anestesia general o bloqueo regional. • Cefalotina 100 mg/kg/dosis. <p>Postoperatorio:</p> <p>Antibióticos:</p> | <p>De acuerdo con cada laboratorio de análisis clínicos de la unidad tratante.</p> <p>Sala de quirófanos y equipo de anestesia adecuado</p> <p>Sondas de silastic 6, 8 o 10 fr.</p> <p>Material de sutura: Vicril 4, 5, 6 y 7 ceros o Polidioxanona 5, 6 y 7 ceros</p> |



CONSEJO
DE
SALUBRIDAD GENERAL

COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A
ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTROFICOS

GRUPO TÉCNICO MALFORMACIONES VÍAS URINARIAS

Categoría: Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos

Subgrupo: Uretra y pene

Enfermedad: Hipospadias [proximal-10%- y distal -90%] (Clasificación Internacional de Enfermedades: Q54 Hipospadias Q540 Hipospadias del glande Q541 Hipospadias peneana Q542 Hipospadias penoscrotal Q543 Hipospadias perineal Q544 Encordamiento congénito del pene Q548 Otras hipospadias Q549 Hipospadias, no especificada Q640 Epispadias)

| Etapas de intervención | Tratamientos / intervenciones | Medicamentos | Otros insumos |
|------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Primera elección: <ul style="list-style-type: none"> • Trimetropin-sulfametoxazol 10 mg/kg/día dependiendo de la edad, por 10 días o • Cefalotina 100 mg/kg/día o • Cefalexina 50 mg/kg/día. por 10 días Segunda: elección: <ul style="list-style-type: none"> • Amoxicilina + acido clavulanico 30 – 40 mg/kg/día por 10 días • Amikacina 15 mg/kdía, 7-10 días Tercera elección: <ul style="list-style-type: none"> • Ceftriaxone 50 mg/kg/día por 7 días • Ceftazidime 30 – 50 mg/kg/días por 7 días o • Cefixime 8 – 10 mg/kg/día, por 7 a 10 días • Ciprofloxacina 30 mg/kg/día por 7 – 10 días Analgésicos: Cateter infusor en pacientes con bloqueo <ul style="list-style-type: none"> • Ketorolaco y metamizol • Oxibutinina* | Seda 4 y 5 ceros o nylon 4 y 5 ceros Lupas magnificadoras para el cirujano Instrumental para microcirugía (pinzas, porta castroviejo y para material fino, tijeras) Tegaderm o Tensoplast |

* Fuera del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud