

**Categoría: VIII Trasplantes**  
**Enfermedad (CIE-10): Z94.7 Trasplante de Córnea**

Etapas de intervención	Tratamientos / intervenciones	Medicamentos	Equipo e insumos
Consulta preoperatoria	Exploración Oftalmológica Completa con Fotografía Clínica del Segmento Anterior Valoración de cavidad vítrea y polo posterior con ecografía Valoración de cámara anterior y ángulo con biomicroscopía ultrasónica Microscopía Especular	Tetracaína sol. oftálmica Tropicamida sol. oftálmica Fenilefrina sol. oftálmica Hipromelosa al 2% sol. oftálmica	Fluoresceína Lámpara de hendidura Ultrasonido modo A y B (opcional) Microscopio especular (opcional)
Valoración clínica prequirúrgica	Electrocardiograma Teleradiografía de tórax Biometría Hemática completa Química Sanguínea de 5 elementos Tiempos de coagulación (TP y TTP)		Equipo y reactivos de laboratorio para las pruebas solicitadas. Eletrocardiógrafo Equipo de rayos X
Consulta Preanestésica	Valoración por anestesiólogo		
Obtención y Valoración de la Calidad del Tejido : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hospitales Procuradores de Córneas</li> </ul>	Perfil Viral (Hepatitis B, C, y VIH ) Cultivo bacteriológico oftalmológico Microscopia especular del tejido Preservación	Ciprofloxacino sol. oftálmica	Equipo y reactivos de laboratorio Iodopovidona Solución de preservación corneal Córnea Blefarostato Tijeras de wescott Pinza 0.3 ó 0.1 mm

**Categoría: VIII Trasplantes**  
**Enfermedad (CIE-10): Z94.7 Trasplante de Córnea**

Etapas de intervención	Tratamientos / intervenciones	Medicamentos	Equipo e insumos
Trasplante	Hospitalización <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Técnica Queratoplastia penetrante</li> </ul> Anestesia general (promedio una hora)	Ciprofloxacino sol. oftálmica Dexametasona , sol. inyectable Dexametasona, sol. oftálmica Pilocarpina sol. Oftálmica al 2% Acetilcolina, Cloruro de. Sol oftálmica. Tropicamida sol. oftálmica Fenilefrina sol. oftálmica Betametasona transeptal, sol. Iny	Visco elástico Solución Salina balanceada Sutura nylon 10/0, con aguja espatulada doble armada 3/8 Poliglactina 8/0 con aguja espatulada doble armada 3/8 Trépanos de diferentes diámetros
Postoperatorio Mediato	Exploración Oftalmológica Completa a las 24 hrs., y cada semana por un mes Paquimetría (opcional)	Prednisolona sol. oftálmica Ciprofloxacino sol. oftálmica Hipromelosa al 0.5 % Timolol sol. Oftálmica.	Paquímetro (opcional)
Postoperatorio Tardío	Exploración Oftalmológica Completa cada mes por un año Paquimetría Microscopia especular Topografía Corneal	Prednisolona sol. oftálmica el 2do. mes Fluorometolona sol. Oftálmica el 3er. mes Hipromelosa al 0.5 % Timolol sol. oftálmica	
Evento adverso Rechazo de trasplante	Exploración Oftalmológica Completa	Betametasona transeptal, sol. Iny Metil Prednisolona sol. inyectable Ciclosporina al 2 % sol. Oftálmica Prednisolona sol. Oftálmica Ciclosporina solución oral y cápsulas Hipromelosa al 0.5 %	Lámpara de hendidura Ultrasonido modo A y B (opcional) Microscopio especular (opcional)