



CONSEJO
DE
SALUBRIDAD GENERAL

COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTROFICOS

GRUPO TÉCNICO MALFORMACIONES VÍAS URINARIAS

Categoría: Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos

Subgrupo :Uréter

Enfermedad: Uréter retrocavo. Clasificación Internacional de Enfermedades Q626 Mala posición del uréter

Etapas de intervención	Tratamientos / intervenciones	Medicamentos	Otros insumos
DIAGNÓSTICO PRENATAL	Ultrasonido intrauterino en el 2º. Trimestre del embarazo, con detección en algunos casos, la presencia de hidronefrosis		<ul style="list-style-type: none">• Ultrasonido adecuado
ATENCIÓN DEL PARTO/CESÁREA (PERIODO NEONATAL INMEDIATO)	<ol style="list-style-type: none">I. Atención del nacimiento en Institución hospitalaria de segundo o tercer nivel (embarazo de alto riesgo).II. Administración de vitamina K, 1 mg IM dosis únicaIII. Sala de labor: reanimación neonatal básica.IV. Descartar otras malformaciones asociadas y manejo específico de las malformacionesV. Traslado programado a institución hospitalaria de tercer nivel que cuente con unidad de terapia intermedia o intensiva pediátrica y/o neonatal a cargo de médicos pediatras intensivistas o neonatólogos. Cirujano pediatra, anesthesiólogo pediatra, ortopedista pediátrico	<ul style="list-style-type: none">• Solución salina• Vitamina K	<ul style="list-style-type: none">• Equipo básico para reanimación neonatal• Equipo de aspiración• Incubadora de calor radiante



CONSEJO
DE
SALUBRIDAD GENERAL

COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A
ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTROFICOS

GRUPO TÉCNICO MALFORMACIONES VÍAS URINARIAS

Categoría: Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos			
Subgrupo :Uréter			
Enfermedad: Uréter retrocavo. Clasificación Internacional de Enfermedades Q626 Mala posición del uréter			
Etapas de intervención	Tratamientos / intervenciones	Medicamentos	Otros insumos
	VI. Examen general de orina con urocultivo para descartar infección VII. Ultrasonido renal y de vejiga		
IDENTIFICACIÓN INICIAL VALORACIÓN MÉDICA Y CLASIFICACIÓN PEDIATRÍA Y/O CIRUJANO PEDIATRA TRASLADO A UNIDAD DE TERCER NIVEL QUE CUENTEN CON URÓLOGO PEDIATRA	Exploración clínica Exámenes iniciales de laboratorio y gabinete: <ul style="list-style-type: none"> • Biometría Hemática completa • Química Sanguínea • Examen General de Orina • Urocultivo <ul style="list-style-type: none"> • Ultrasonido de vías urinarias • Uretrocistograma miccional • Urografía excretora <ul style="list-style-type: none"> • Gamma grama renal en los casos que lo ameriten 		<ul style="list-style-type: none"> • Insumos para las pruebas de laboratorio solicitadas • Equipo de ultrasonido con transductores adecuados para neonatos • Equipo de RX; material de contraste • Gama cámara



CONSEJO
DE
SALUBRIDAD GENERAL

COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A
ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTROFICOS

GRUPO TÉCNICO MALFORMACIONES VÍAS URINARIAS

Categoría: Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos

Subgrupo :Uréter

Enfermedad: Uréter retrocavo. Clasificación Internacional de Enfermedades Q626 Mala posición del uréter

Etapas de intervención	Tratamientos / intervenciones	Medicamentos	Otros insumos
VALORACIÓN POR UROLOGÍA PEDIÁTRICA	<p>Exámenes de laboratorio complementarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biometría hemática completa • Química sanguínea • Electrolitos séricos • Tiempos de coagulación • Grupo sanguíneo y Rh • Reacciones cruzadas <p>Exámenes de gabinete.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ultrasonido de vías urinarias • Cistograma miccional • Urografía excretora (posterior a la etapa neonatal) <ul style="list-style-type: none"> • Tratamiento del dolor <ul style="list-style-type: none"> • Tratamiento de infección de vías urinarias en los casos que lo ameriten 	<ul style="list-style-type: none"> • Medicamentos para el dolor de acuerdo a edad del paciente, condición clínica y criterio médico <p>Antibióticos:</p> <p>Primera elección:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amoxicilina 30 – 40 mgs/kg/día, o • Trimetropin-sulfametoxazol 10 mg/kg/día dependiendo de la edad, por 10 días 	



CONSEJO
DE
SALUBRIDAD GENERAL

COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A
ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTROFICOS

GRUPO TÉCNICO MALFORMACIONES VÍAS URINARIAS

Categoría: Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos

Subgrupo :Uréter

Enfermedad: Uréter retrocavo. Clasificación Internacional de Enfermedades Q626 Mala posición del uréter

Etapas de intervención	Tratamientos / intervenciones	Medicamentos	Otros insumos
	<ul style="list-style-type: none"> • Gamma grama renal en los casos que lo ameriten • Reimplante vésico-ureteral • Cistoscopia para retiro de catéteres JJ 2-3 meses después de la cirugía 	<p>Segunda: elección:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amoxicilina + acido clavulanico 30 – 40 mg/kg/día por 10 días Tercera elección: • Cefixime 8 – 10 mg/kg/día, por 7 a 10 días • Ceftriaxone 50 mg/kg/día por 7 días o • Ceftazidime 30 – 50 mg/kg/días por 7 días o • Ciprofloxacina 30 mg/kg/día por 7 – 10 días <p>Durante el preoperatorio y postoperatorio</p>	
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO	<ul style="list-style-type: none"> • Uretero-uretero-anastomosis 	<ul style="list-style-type: none"> • Insumos para el procedimiento anestésico general o mediante bloqueo • Paquete globular en los casos que lo requieran 	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo de endoscopia • Cistoscopio pediátrico • Resectoscopio pediátrico con asa fría o caliente • Sónda de Foley 8 -12 fr • Sonda K 731 • Catéter doble J



CONSEJO
DE
SALUBRIDAD GENERAL

COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A
ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTROFICOS

GRUPO TÉCNICO MALFORMACIONES VÍAS URINARIAS

Categoría: Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos

Subgrupo :Uréter

Enfermedad: Uréter retrocavo. Clasificación Internacional de Enfermedades Q626 Mala posición del uréter

Etapas de intervención	Tratamientos / intervenciones	Medicamentos	Otros insumos
			Suturas: <ul style="list-style-type: none">• Monocril 5 ceros• Dermalón 3-5 ceros• Acido poliglicólico 1 – 5 ceros• Polidioxanona 5 – 6 ceros• Seda 2 ceros• Pen Rose• Equipo de bloqueo• Equipo para anestesia general
SEGUIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">• Examen General de Orina mensual los primeros 3 meses y de acuerdo a evolución cada 6 a 12 meses• Gamagrama renal 3 a 12 3 a 12 meses posterior a la cirugía y estudios posteriores de acuerdo a evolución clínica y resultado inicial		