

**CONTROL DE INMUNIZACIONES DEL BECARIO
DIRECCION DE CENTROS DE ATENCION INFANTIL**

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No _____

| | | | |
|--------------------|---------------------|------------------|---------|
| NOMBRE DEL BECARIO | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres |
| | Fecha de Nacimiento | Día | Mes |
| | | | Año |

| ESQUEMA BASICO DE VACUNACION | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| VACUNA | ENFERMEDAD QUE PREVIENE | DOSIS | | EDAD | FECHA DE VACUNACIÓN |
| BCG | Tuberculosis Miliar y Meningitis Tuberculosa | UNICA | 0.1 m | AL NACER | |
| HEPATITIS B | La Hepatitis B enfermedad Infecciosa trasmisible que afecta las funciones del hígado * <i>depende del laboratorio</i> | PRIMERA | *5 o 10 µg | AL NACER | |
| | | SEGUNDA | | 2 MESES | |
| | | TERCERA | | 6 MESES | |
| PENTAVALENTE ACELULAR | Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomieltitis e Infecciones por Haemophilus Influenza tipo b | PRIMERA | 0.5 ml | 2 MESES | |
| | | SEGUNDA | | 4 MESES | |
| | | TERCERA | | 6 MESES | |
| | | CUARTA | | 18 MESES | |
| DPT | Difteria, Tosferina, Tétanos, | REFUERZO | 0.5 ml | 4 AÑOS | |
| ROTAVIRUS | Infección por rotavirus es la causa más común de enfermedad diarreica | PRIMERA | 1 ml | 2 MESES | |
| | | SEGUNDA | | 4 MESES | |
| | | TERCERA | | | |
| NEUMOCOCCICA CONJUNGADA 7 VALENTE | Infecciones invasivas en niños, otitis media aguda, neumonía y meningitis | PRIMERA | 0.5 ml | 2 MESES | |
| | | SEGUNDA | | 4 MESES | |
| | | TERCERA | | 1 AÑO | |
| | | CUARTA | | | |
| ANTIINFLUENZA | Enfermedad viral aguda muy contagiosa se presenta con mayor intensidad de octubre a mayo | PRIMERA | 0.25 ml | De 6 a los 35 meses | |
| | | SEGUNDA | 0.25 ml | Al mes de la primera | |
| | | Revacunación | 0.5 ml | Anual Oct. y Nov. | |
| TRIPLE VIRAL SRP | Sarampión, Rubeola y Parotiditis | PRIMERA | 0.5 ml | 1 AÑO | |
| | | SEGUNDA | 0.5 ml | 6 AÑOS | |
| SABIN | Poliomieltitis. | ADICIONALES dos gotas (0.1 ml) | | | |
| SR | Sarampión y Rubeola | ADICIONALES 0.5 mililitros | | | |
| Varicela | Enfermedad infectocontagiosa de tipo Virus de la Varicela Zóster | PRIMERA | 0.5 m | De 12 meses a 12 años | |
| | | Adicional | | | |
| HEPATITIS A | Es causada por virus del tipo A es una enfermedad infectocontagiosa aguda | fecha elegida | 0.5 ml | | |
| | | SEGUNDA | 6 a 12 meses | | |
| ANTIINFLUENZA | Enfermedad viral aguda muy contagiosa se presenta con mayor intensidad de octubre a mayo | ADICIONALES | | | |