



CONSEJO
DE
SALUBRIDAD GENERAL

COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A
ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTROFICOS

GRUPO TÉCNICO MALFORMACIONES VÍAS URINARIAS

| Categoría: Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos Subgrupo :Uréter Enfermedad: Uréter Ectópico. Clasificación Internacional de la Enfermedades: Q626 Mala posición del uréter | | | |
|--|---|---|---|
| Etapas de intervención | Tratamientos / intervenciones | Medicamentos | Otros insumos |
| DIAGNÓSTICO PRENATAL | Ultrasonido intrauterino en el 2º. Trimestre del embarazo | | <ul style="list-style-type: none"> • Ultrasonido adecuado |
| ATENCIÓN DEL PARTO/CESÁREA (PERIODO NEONATAL INMEDIATO) | I. Atención del nacimiento en Institución hospitalaria de segundo o tercer nivel (embarazo de alto riesgo). II. Administración de vitamina K, 1 mg IM dosis única III. Sala de labor: reanimación neonatal básica. IV. Descartar otras malformaciones asociadas y manejo específico de las malformaciones V. Traslado programado a institución hospitalaria de tercer nivel que cuente con unidad de terapia intermedia o intensiva pediátrica y/o neonatal a cargo de médicos pediatras intensivistas o neonatólogos. Cirujano pediatra, anesthesiólogo pediatra, ortopedista pediátrico | <ul style="list-style-type: none"> • Solución salina • Vitamina K | <ul style="list-style-type: none"> • Equipo básico para reanimación neonatal • Equipo de aspiración • Incubadora de calor radiante |



CONSEJO
DE
SALUBRIDAD GENERAL

COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A
ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTROFICOS

GRUPO TÉCNICO MALFORMACIONES VÍAS URINARIAS

| Categoría: Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos | | | |
|--|--|--------------|---|
| Subgrupo :Uréter | | | |
| Enfermedad: Uréter Ectópico. Clasificación Internacional de la Enfermedades: Q626 Mala posición del uréter | | | |
| Etapas de intervención | Tratamientos / intervenciones | Medicamentos | Otros insumos |
| | VI. Examen general de orina con urocultivo para descartar infección VII. Ultrasonido renal y de vejiga VIII. Profilaxis antimicrobiana en casos que lo requieran | | |
| IDENTIFICACIÓN INICIAL VALORACIÓN MÉDICA Y CLASIFICACIÓN PEDIATRÍA Y/O CIRUJANO PEDIATRA | Exploración clínica Exámenes iniciales de laboratorio y gabinete: <ul style="list-style-type: none"> • Biometría Hemática completa • Química Sanguínea • Examen General de Orina • Urocultivo | | <ul style="list-style-type: none"> • Insumos para las pruebas de laboratorio solicitadas |
| TRASLADO A UNIDAD DE TERCER NIVEL QUE CUENTEN CON URÓLOGO PEDIATRA | <ul style="list-style-type: none"> • Ultrasonido de vías urinarias • Cistograma miccional Urografía excretora (posterior a la etapa neonatal) <ul style="list-style-type: none"> • Gammagrama renal en los casos que lo ameriten | | <ul style="list-style-type: none"> • Equipo de ultrasonido con transductores adecuados para neonatos • Equipo de RX; material de contraste • Gama cámara |



CONSEJO
DE
SALUBRIDAD GENERAL

COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A
ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTROFICOS

GRUPO TÉCNICO MALFORMACIONES VÍAS URINARIAS

Categoría: Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos

Subgrupo :Uréter

Enfermedad: Uréter Ectópico. Clasificación Internacional de la Enfermedades: Q626 Mala posición del uréter

| Etapas de intervención | Tratamientos / intervenciones | Medicamentos | Otros insumos |
|------------------------------------|--|--|--|
| VALORACIÓN POR UROLOGÍA PEDIÁTRICA | <p>Exámenes de laboratorio complementarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biometría hemática completa • Química sanguínea • Electrolitos séricos • Tiempos de coagulación • Grupo sanguíneo y Rh • Reacciones cruzadas <p>Exámenes de gabinete.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ultrasonido de vías urinarias • Cistograma miccional • Urografía excretora (posterior a la etapa neonatal) • Uso de antibióticos profilácticos en los casos que lo ameriten • Tratamiento de infección de vías urinarias en los casos que lo ameriten • Gammagrama renal en los casos que lo ameriten • Tratamiento de infección de vías urinarias en los casos que lo ameriten | <ul style="list-style-type: none"> • Amoxicilina 30 – 40 mgs/kg/dosis cada 24 horas <p>Antibióticos: Primera elección:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amoxicilina 30 – 40 mgs/kg/día, o • Trimetropin-sulfametoxazol 10 mg/kg/día dependiendo de la edad, por 10 días | <ul style="list-style-type: none"> • Insumos para las pruebas de laboratorio solicitadas • Gama cámara |



CONSEJO
DE
SALUBRIDAD GENERAL

COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTROFICOS

GRUPO TÉCNICO MALFORMACIONES VÍAS URINARIAS

Categoría: Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos

Subgrupo :Uréter

Enfermedad: Uréter Ectópico. Clasificación Internacional de la Enfermedades: Q626 Mala posición del uréter

| Etapas de intervención | Tratamientos / intervenciones | Medicamentos | Otros insumos |
|------------------------|---|---|---------------|
| | <ul style="list-style-type: none">• Gamma grama renal en los casos que lo ameriten• Reimplante vésico-ureteral | Segunda: elección: <ul style="list-style-type: none">• Amoxicilina + acido clavulanico 30 – 40 mg/kg/día por 10 días Tercera elección:• Cefixime 8 – 10 mg/kg/día, por 7 a 10 días• Ceftriaxone 50 mg/kg/día por 7 días o• Ceftazidime 30 – 50 mg/kg/días por 7 días o• Ciprofloxacina 30 mg/kg/día por 7 – 10 días Durante el preoperatorio y postoperatorio | |



CONSEJO
DE
SALUBRIDAD GENERAL

COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A
ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTROFICOS

GRUPO TÉCNICO MALFORMACIONES VÍAS URINARIAS

| Categoría: Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos Subgrupo :Uréter Enfermedad: Uréter Ectópico. Clasificación Internacional de la Enfermedades: Q626 Mala posición del uréter | | | |
|--|---|---|--|
| Etapas de intervención | Tratamientos / intervenciones | Medicamentos | Otros insumos |
| PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO | <p>El procedimiento quirúrgico, endoscópico, laparoscópico o por cirugía abierta dependerá del nivel del uretero ectópico, de la condición clínica del paciente y criterio médico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reimplante ureteral • Uretero-uretero-anastomosis • Pielo-uretero- anastomosis • Reimplante simple | <ul style="list-style-type: none"> • Insumos para el procedimiento anestésico general o mediante bloqueo • Paquete globular en los casos que lo requieran | <ul style="list-style-type: none"> • Equipo de endoscopia • Cistoscopio pediátrico • Resectoscopio pediátrico con asa fría o caliente • Sónda de Foley 8 -12 fr • Sonda K 731 • Catéter doble J <p>Suturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monocril 5 ceros • Dermalón 3-5 ceros • Acido poliglicólico 1 – 5 ceros • Polidioxanona 5 – 6 ceros • Seda 2 ceros • Pen Rose • Equipo de bloqueo <p>Equipo para anestesia general</p> |



CONSEJO
DE
SALUBRIDAD GENERAL

COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A
ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTROFICOS

GRUPO TÉCNICO MALFORMACIONES VÍAS URINARIAS

| Categoría: Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|
| Subgrupo :Uréter | | | |
| Enfermedad: Uréter Ectópico. Clasificación Internacional de la Enfermedades: Q626 Mala posición del uréter | | | |
| Etapas de intervención | Tratamientos / intervenciones | Medicamentos | Otros insumos |
| SEGUIMIENTO | Examen General de Orina mensual los primeros 3 meses y de acuerdo a evolución cada 6 a 12 meses posterior a la cirugía y estudios posteriores de acuerdo a evolución clínica y resultado inicial <ul style="list-style-type: none">• Descartar la presencia de estenosis ureteral | | |